

ORARIO DI APERTURA

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

7,00 - 19,00

SABATO

Mattino 7,30 - 12,30

I prelievi si eseguono tutte le mattine dalle 7,00 alle 10,00, il sabato dalle 7,30 alle 10,00.

POLIAMBULATORIO ANALYSIS

Poliambulatorio privato
Laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche

Via Partigiani D'Italia,3 Busseto

Tel./Fax 0524 97098

E-mail: bussetoanalysis@gmail.com

Sito: www.poliambulatorioanalysis.it

POLIAMBULATORIO ANALYSIS

BREATH TEST AL LATTOSIO



POLIAMBULATORIO ANALYSIS

Scheda informativa

Le intolleranze alimentari costituiscono un capitolo importante nella patologia del tubo digerente e possono condizionare sintomatologie croniche, difficili da diagnosticare.

Una intolleranza alimentare molto conosciuta e molto diffusa è rappresentata dall'intolleranza al lattosio, principale zucchero presente nel latte e nei suoi derivati.

CAUSA

L'intolleranza al lattosio è una forma diffusa di carenza intestinale dell'enzima Lattasi. Questo enzima è prodotto dall'intestino tenue e agisce sul lattosio, una carenza dell'enzima digestivo causa l'incapacità intestinale a digerire il lattosio. Il lattosio, senza essere digerito dal nostro intestino tenue, raggiunge il colon dove la microflora intestinale lo aggredisce e provoca, per fermentazione, produzione di gas.

PRINCIPALI SINTOMI

I sintomi si manifestano 1- 2 ore dopo il pasto contenente latte o suoi derivati e principalmente sono:

Gonfiore intestinale con presenza di gas (flatulenza)

Dolori addominali

Diarrea

BREATH TEST AL LATTOSIO

Permette di diagnosticare con certezza l'intolleranza al lattosio

Test non invasivo della durata di 4 ore

Il giorno precedente il test, il paziente deve evitare fibre e carboidrati complessi quali, quelli contenuti in frutta, verdura, pane e pasta. In particolare la sera precedente è raccomandata una cena leggera; evitare anche caramelle, chewing-gum e alcolici.

Presentarsi a digiuno da un minimo di 10 ore la mattina dell'esame. Si può assumere acqua non gasata.

Mezz'ora prima e durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica

Il test deve essere eseguito almeno quattro settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia o almeno una settimana dopo la sospensione di lassativi

Prezzo 120 euro

Esito in 1 gg

Il test si effettua su prenotazione