

ORARIO DI APERTURA

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

7,00 - 19,00

SABATO

Mattino 7,30 - 12,30

I prelievi si eseguono tutte le mattine dalle 7,00 alle 10,00, il sabato dalle 7,30 alle 10,00.

POLIAMBULATORIO
ANALYSIS

Poliambulatorio privato
Laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche

Via Partigiani D'Italia,3 Busseto

Tel./Fax 0524 97098

E-mail: bussetoanalysis@gmail.com

Sito: www.poliambulatorioanalysis.it

POLIAMBULATORIO
ANALYSIS

BREATH TEST AL
LATTULOSIO
OCT



POLIAMBULATORIO
ANALYSIS

Scheda informativa

Il test per la determinazione del tempo di transito oro-cecale (OCT) è un esame clinico per la diagnosi di diverse patologie che interessano il tratto gastro-intestinale. Nell'intestino umano, i batteri presenti nel colon sono i maggiori responsabili della produzione di idrogeno in seguito alla fermentazione dei carboidrati non digeriti. L'idrogeno prodotto dai batteri viene assorbito dalle pareti del colon ed entra nel circolo sanguigno, attraverso il quale raggiunge i polmoni e viene espulso tramite la respirazione.

Il *breath test* al lattulosio calcola il tempo di transito oro-cecale, ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui si ingerisce del cibo e il momento in cui il cibo stesso raggiunge l'intestino cieco. Un tempo di transito troppo rapido può essere causa di numerosi disturbi.

PRINCIPALI SINTOMI

I sintomi si manifestano 1- 2 ore dopo il pasto contenente latte o suoi derivati e principalmente sono:

Gonfiore intestinale con presenza di gas (flatulenza)

Dolori addominali

Diarrea

BREATH TEST AL LATTULOSIO determinazione OCT

Test non invasivo della durata di 4 ore

Il giorno precedente il test, il paziente deve evitare fibre e carboidrati complessi quali, quelli contenuti in frutta, verdura, pane e pasta. In particolare la sera precedente è raccomandata una cena leggera; evitare anche caramelle, chewing-gum e alcolici.

Presentarsi a digiuno da un minimo di 10 ore la mattina dell'esame. Si può assumere acqua non gasata.

Mezz'ora prima e durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica

Il test deve essere eseguito almeno quattro settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia o almeno una settimana dopo la sospensione di lassativi

Prezzo 120 euro

Esito in 1 gg

Il test si effettua su prenotazione