

ORARIO DI APERTURA

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

7,00 - 19,00

SABATO

Mattino 7,30 - 12,30

I prelievi si eseguono tutte le mattine dalle 7,00 alle 10,00, il sabato dalle 7,30 alle 10,00.

**POLIAMBULATORIO  
ANALYSIS**

Poliambulatorio privato  
Laboratorio di analisi chimico-cliniche  
e microbiologiche

Via Partigiani D'Italia,3 Busseto

Tel./Fax 0524 97098

E-mail: [bussetoanalysis@gmail.com](mailto:bussetoanalysis@gmail.com)

Sito: [www.poliambulatorioanalysis.it](http://www.poliambulatorioanalysis.it)

**POLIAMBULATORIO  
ANALYSIS**

**BREATH TEST AL  
LATTULOSIO  
SIBO**



**POLIAMBULATORIO  
ANALYSIS**

Scheda informativa

Una problematica molto frequente e spesso sottovalutata, legata all'apparato gastrointestinale che si riflette fortemente sulla dieta quotidiana delle persone, è la sindrome da sovracrescita batterica denominata SIBO dall'inglese Small Intestinal Bacterial Overgrowth.

Tale sindrome si verifica quando popolazioni di batteri entrano nell'ultimo tratto dell'intestino tenue (in cui non dovrebbero essere presenti o residenti in basse concentrazioni), portando ad una abnorme proliferazione causata da modifiche nell' "ecosistema intestinale", regolato da un equilibrio tra meccanismi di difesa, fattori ambientali ed interazioni microbiche.

## PRINCIPALI SINTOMI

I sintomi si manifestano 1- 2 ore dopo il pasto contenente latte o suoi derivati e principalmente sono:

Gonfiore intestinale con presenza di gas (flatulenza)

Dolori addominali

Diarrea

## BREATH TEST AL LATTULOSIO determinazione SIBO

Test non invasivo della durata di 2 ore

Il giorno precedente il test, il paziente deve evitare fibre e carboidrati complessi quali, quelli contenuti in frutta,verdura, pane e pasta. In particolare la sera precedente è raccomandata una cena leggera; evitare anche caramelle, chewing-gum e alcolici.

Presentarsi a digiuno da un minimo di 10 ore la mattina dell'esame. Si può assumere acqua non gasata.

Mezz'ora prima e durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica

Il test deve essere eseguito almeno quattro settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia o almeno una settimana dopo la sospensione di lassativi

Prezzo 100 euro

Esito in 1 gg

Il test si effettua su prenotazione